Hydrologische Forschung im Dienste der Landwirtschaft

Regula Isabelle Mülchi

Workshop 3: Region zentrales und östliches Mittelland

Wie kann sich die Landwirtschaft anpassen, ohne die Gewässer zu gefährden?

12. Symposium Anpassung an den Klimawandel

16. März 2021

Fülle an hydrologischen Daten aus Hydro-CH2018

- > Abfluss in Flüssen (makro, meso, mikro)
 - > Seepegel
 - > Grundwasser
 - > Fluss- und Seetemperaturen
 - > Auswirkungen auf aquatisches Leben
- Genügen diese Daten um Schlüsse für die Landwirtschaft zu ziehen?
-

Herausforderung fürs Mittelland

Sommerabfluss

Prozentuale Abweichung zur Referenzperiode in %

NM7Q

Einzugsgebietsgrösse in km²

Abnahme im
Sommer und
Sommertrockenheit
grösste
Herausforderung!

Roadmap für Hydrologie der Zukunft?

Die hydrologischen Simulationen zeigen klar und eindeutig, dass die sommerliche Trockenheit zu einer grossen Herausforderung für die Landwirtschaft wird. Sie genügen aber noch nicht, um regionale bis lokale Massnahmen in der Landwirtschaft zu planen.

Ja

Nein

Warum?
Was wird benötigt?
Indikatoren? Schwellenwerte?

In welcher Form können
unsere Resultate dienen?
Plattformen?

Teilgruppe 2:

Alternativen zur Bewässerung

These

Landwirtschaft braucht in der Schweiz keine
Bewässerung um wirtschaftliche tragfähig zu sein

Moderation: Annelie Holzkämper

Hintergrund

Geeignete Quellen:
Flüsse mit $Q_{\text{August}} > 1 \text{ m}^3/\text{s}$
Grundwassermächtigkeit $> 10 \text{ m}$
Grosse Seen

Datenquellen: swisstopo, BAFU

→ Wasser für Bewässerung steht nicht überall und zu jeder Zeit zur Verfügung

Hintergrund

Abflussänderungen im Vergleich zu 1983-2010 [m³/s]

Emissionspfade

- RCP2.6 Mit Klimaschutz
- RCP4.5
- RCP8.5 Ohne Klimaschutz

→ Mit Klimawandel wird die Verfügbarkeit von Flusswasser für Bewässerung abnehmen

Hintergrund

- Wasser für Bewässerung steht nicht überall und zu jeder Zeit unbegrenzt zur Verfügung
 - «Alternativen zur Bewässerung» leisten schon heute einen Beitrag zur Sicherung der Agrarproduktivität
- Mit abnehmenden Sommerabflüssen sinkt die Verfügbarkeit von Bewässerungswasser
 - «Alternativen zur Bewässerung» kommt mit Klimawandel eine wachsende Bedeutung zu

Welche «Alternativen» können das sein?

- Kultur- und Sortenwahl
 - e.g. Frühreife, tiefere Wurzeln, Toleranzen
- Evaporation reduzieren
 - e.g. Mulchen, Zwischenkulturen
- Wasserretention erhöhen
 - e.g. reduzierte Bodenbearbeitung, Zwischenkulturen, Biochar, ...

Kulturen und Sorten

Trocken- und Hitzestress

Blüte = eine kritische Phase

Blüte

Frühreife zur Vermeidung
von Trockenheitseinflüssen

Kulturen und Sorten

Mit mehr Wurzelbiomasse
können Bodenwasserreserven
besser ausgenutzt werden

Evaporation reduzieren

Mulchen (Ernterückstände, Plastik), Zwischenkulturen

Bodenwasserretention verbessern

Durchschnitt Matrixpotential von Pflug- und Direktsaatverfahren (3. Juni bis 20. August)

Abb. 5. In der Pflugparzelle wird die überlockerte Ackerkrume insbesondere bei den Überfahrten anlässlich der Saat und Herbizidbehandlung verdichtet und die Infiltrationsleistung des Bodens markant eingeschränkt. (Foto: F. Thomas, Farming Communication, Frankreich)

Bodenwasserretention verbessern

Organisches Material

z.B.

- Kompost
- Hofdünger
- Ernterückstände
- Zwischenkulturen
- Biochar

Diskussionsfragen

- Wie unabhängig kann landwirtschaftliche Produktion in der Schweiz von Bewässerung sein?
- Wie schätzen Sie die Potentiale verschiedener «Alternativen zur Bewässerung» ein?
- Was könnte der Umsetzung von «Alternativen zur Bewässerung» im Wege stehen?

Bewässerung: nur eine von verschiedenen Strategien gegen Trockenheit

austauschen
verstehen
weiterkommen

Bettina Koster-Marbot
16.3.2021

Ablauf und Ziele Workshop

- Kritische Prüfung der Thesen
- Formulierung von Lösungsansätzen, auch unkonventionell
- Die wichtigsten Erkenntnisse im Plenum vorstellen

Gesucht ist...

**...eine Rapportiererin oder ein
Rapportierer, um die
wichtigsten Erkenntnisse im
Plenum vorzustellen**

Wer würde dies übernehmen?

Danke im Voraus 😊

These

Bei der Entwicklung von **neuen Bewässerungsprojekten** muss eine Auseinandersetzung mit der Frage stattfinden,

ob und wie sich die standortangepasste Produktion aufgrund des Klimawandels in der Region verändern wird.

Das alleinige Ziel, mit der Bewässerung auch in Zukunft die gleiche Produktion wie heute zu ermöglichen, ist nicht - respektive nicht an allen Standorten – nachhaltig und zielführend.

These in anderen Worten....

- Sollten wir die Produktionssysteme, wie wir sie heute haben, möglichst schnell mit genügend Bewässerungsinfrastruktur absichern?
- Oder müssen wir die *Landwirtschaft von morgen* sowieso – aufgrund des Klimawandels - grundsätzlich neu definieren? Und wenn ja, welche Rolle spielt die Bewässerung?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Für weitere Auskünfte besuchen Sie unsere Website

www.agridea.ch oder schicken Sie uns ein E-Mail an info@agridea.ch

Lindau

Eschikon 28 • CH-8315 Lindau

T +41 (0)52 354 97 00 • F +41 (0)52 354 97 97

Lausanne

Jordils 1 • CP 1080 • CH-1001 Lausanne

T +41 (0)21 619 44 00 • F +41 (0)21 617 02 61

Cadenazzo

A Ramél 18 • CH-6593 Cadenazzo

T +41 (0)91 858 19 66 • F +41 (0)91 850 20 41

Berner
Fachhochschule

Optimale Wassernutzung in der Landwirtschaft

Andrea Marti, Andreas Keiser

März 2021

- ▶ Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

Bewässerte Flächen nach Kulturen und Aufteilung des Wasserverbrauchs in der Schweiz

Quelle: Zusatzerhebung landwirtschaftliche Betriebszählung, 2013;
Schweizerische Hydrologische Kommission, 2013

Bewässerung in der Schweiz - Kulturen

Quelle: Landwirtschaftliche Betriebszählung – Zusatzerhebung, BFS, 2010, 2013, 2016

► Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

Woher kommt das Bewässerungswasser?

2016

- Betriebe mit Grundwasser
- Betriebe mit Bächen, Kanälen
- Betriebe mit Flüssen und Seen
- Betriebe mit Oberflächenwasser im Betrieb
- Betriebe mit Wasser aus dem Versorgungsnetz
- Betriebe mit anderen Quellen

Récapitulatif des restrictions de pompage dans la Broye/VD en 2018

Date	Restriction	Location	Status
01.05.2018			pompage autorisé
17.07.2018			pompage avec restriction
19.07.2018			pompage interdit
23.07.2018			pompage autorisé
26.07.2018			pompage avec restriction
02.08.2018			pompage interdit
06.08.2018			pompage interdit
09.08.2018			pompage avec restriction
13.08.2018			pompage interdit
16.08.2018		-> Lucens	pompage avec restriction
21.08.2018			pompage interdit
23.08.2018			pompage interdit
27.08.2018			pompage interdit
30.08.2018		-> Henniez	pompage avec restriction
03.09.2018		-> Lucens	pompage avec restriction
06.09.2018			pompage interdit
11.09.2018			pompage interdit
20.09.2018			pompage interdit
26.09.2018			pompage interdit
03.09.2018			pompage interdit
09.09.2018			pompage interdit
22.09.2018			pompage interdit
29.09.2018			pompage interdit
05.11.2018			pompage interdit
12.11.2018			pompage interdit
12.12.2018			pompage autorisé
19.12.2018			pompage autorisé

Quelle: Landwirtschaftliche Betriebszählung – Zusatzerhebung, BFS, 2016

► Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

Gezielte Wassernutzung erhöht Ressourceneffizienz

1. Juli 2019

Tröpfchenbewässerung

Sprinkler

unbewässert

15. Juli 2019

Tröpfchenbewässerung

Sprinkler

unbewässert

22. Juli 2019

Tröpfchenbewässerung

Sprinkler

unbewässert

5. August 2019

Tröpfchenbewässerung

Sprinkler

unbewässert

Seedorf 2019: Vergleich
Bewässerungssysteme

Lady Claire
22.4.

tiefgründiger Boden

Speicherkapazität gut pflanzenverfügbares
Wasser (gesamtes Profil): 38 mm

(10-1-650006)

Ertrag und Wirtschaftlichkeit

- ▶ Sprinkler mit höchsten vermarktbaren Erträgen (rund 300 dt/ha)
- ▶ ..bester Wassernutzungseffizienz (76 kg/mm)
- ▶ ..bestem Erlös pro ha (rund 12'000.-)

	unbewässert	Tröpfchenbewässerung	Sprinkler
Erlös Brutto	CHF 4'793.98	CHF 11'263.33	CHF 13'149.21
- Preis L. Claire 2019: 43.60 /dt			
Erlös Futterkartoffeln (sofern nicht selbst verfüttert)	CHF 1'168.06	CHF 1'256.67	CHF 951.32
- Preis: 5.80 /dt			
Kosten Bewässerung	CHF 0.00	CHF 4'020.00	CHF 2'130.00
- Arbeit, Bewässerungsanlage, Wasser, Differenz Fertigation			
Erlös Netto*	CHF 5'962.04	CHF 8'500.00	CHF 11'970.53

Kosten Saatgut, Pflanzung, PSM, Ernte und Arbeitsstunden sind nicht eingerechnet

Anpassungsstrategien in der Landwirtschaft

kurzfristig

mittelfristig
(5 – 10 a)

langfristig
(> 10 a)

Anbau
Bewässerungs-
praxis
optimieren
(gezielte Steuerung,
Gabenhöhe,
Intensität)

Produktionstechnik
(Saatzeitpunkt,
Saatstärke, Fruchtfolge,
Bodenbearbeitung)

Kulturwahl

Forschung & Beratung
Wasserspeicher erhalten/ erhöhen
(Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, Erosionsschutz)

Bewässerungskennzahlen erforschen
(Zusammenhänge Boden- Wasser- Pflanze)

Angepasste
Sorten
(Hitze- &
Trockentoleranz)

Technik & Infrastruktur
Bestehende
Technik
optimieren

Neue
Bewässerungs-
technik

Alternative
Wasserquellen
(statt kleine Oberflächen-
gewässer)

Speicherbecken
(Puffer bei Nutzungsengpässen)

B
F
H

Berner Fachhochschule
Hochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften HAFL

Stationen

Blog

Publikationen

Informationen für die
Betriebsleiter

Partner & Sponsoren

Kontakt

fr / de

- zu trocken
- leicht trocken
- feucht
- feucht
- nass
- zu nass
- Wartung
- Messung abgeschlossen
- bewässert
- unbewässert

Farblegende

Bewässerungsversuche der HAFL

Die Kartoffeln mit Bewässerung kühlen?

Die hohen Temperaturen sind eine grosse Herausforderung für die Kartoffelbestände. Wenn die Zielkaliber noch nicht erreicht sind, stellt sich die Frage: Kann eine Bewässerung den Bestand kühlen?

31 Juli 2020 [Zum Eintrag](#)

Bewässerungsversuche der HAFL

Wasserbilanz als Ergänzung zu den Bodensonden vom Bewässerungsnetz?

Zusammen mit dem Inforama Ins, dem Strickhof und dem LZSG Salez vergleichen wir die Messungen der Bodensonde mit dem Online-Tool der ALB Bayern.

10 Juni 2020 [Zum Eintrag](#)

Suche

Station	Seriennummer
Alterswil	863309
Arnex-sur-Orbe	513607
Arth	511775
Aubonne	513605
Avenches	510471

Bewässerungspraxis optimieren

[Startseite](#) | [Wir über uns](#) | [Bauen / T](#)

[Bewässerungsforum](#) | [Steuerungsmodelle](#)

Bestehende Technik optimieren

69% Rollomat (IrrVD: 64%)

21% Sprinkler (IrrVD: 6%)

1% Giessbalken (IrrVD: 0%)

9% Tropfbew. (IrrVD: 30%)

Häufigkeit der Bewässerungstechnik im Bewässerungsnetz der HAFL und im Ressourcenprojekt «Efficiency Irrigation Vaud (IrrVD)» (keine anderen schweizweite Daten bekannt).

Sorge tragen zum Wasserspeicher

Ressourcenprojekt «Efficiency Irrigation Vaud», 104 Parzellen.

Skizze: Stéphane Burgos, HAFL

Fazit

- ▶ An guten, ertragreichen Standorten erhöht eine gezielte Bewässerung die Ressourceneffizienz und ist zentral für eine wirtschaftliche Produktion.
- ▶ Kurzfristig umsetzbare Massnahmen (Gezielte Bewässerungssteuerung, Optimierung der bestehenden Bewässerungstechnik) entschärfen aktuelle Nutzungskonflikte und tragen entscheidend zu einer effizienteren Wassernutzung bei.
- ▶ Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten muss die Nutzung von kleineren Oberflächengewässern mittelfristig durch die Erschliessung anderer Wasserquellen ersetzt werden.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

www.bewaesserungsnetz.ch

Andreas Keiser | 031 910 21 50

andreas.keiser@bfh.ch

Andrea Marti | 031 910 29 25

andrea.marti@bfh.ch

► Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

Wiederherstellung von Feuchtgebieten für die Artenvielfalt

Thesen

- 1. Die Notwendigkeit, rasch Massnahmen zur Wiederherstellung von Feuchtgebieten für die Biodiversität zu ergreifen, ist noch nicht in Politik und Gesellschaft angekommen.** Die grossen Herausforderungen und Chancen, die sich mit der Wiederherstellung von Stillgewässern, Mooren und Riedwiesen im Klimawandel ergeben, haben auch in den Berichten zu Hydro 2018 viel zu wenig Niederschlag gefunden.
- 2. Aus ökologischer, klimapolitischer und ökonomischer Sicht braucht es ein Umdenken bei der Sanierung von Drainagen.** Die Interessen von Klimaschutz, Klimaanpassung und Biodiversitätsförderung müssen im Rahmen von Strukturverbesserungen ein höheres Gewicht erhalten. Die Kantone müssen im Rahmen der Planungen für die ökologische Infrastruktur Vorranggebiete für die Wiederherstellung von Feuchtgebieten ausscheiden. Es braucht Sektor übergreifend abgestimmte Schutz- und Nutzungsstrategien betreffend Feuchtgebiete und Wassernutzung

Innovationsprojekt "Umgang mit drainierten Böden"

(Kantone ZH, BE, AG, 2017)

[Link](#) zum Faktenblatt Kt. AG

Tagung Schweizer Gewässer im Klimawandel, 16. März 2021

Workshop 3: Wie kann sich die Landwirtschaft anpassen, ohne die Gewässer zu gefährden?

Teilgruppe: «Naturnahe Gewässerräume sind eine Voraussetzung für eine klima- und gewässerverträgliche Landwirtschaft.»

9. März 2021:

WWF: Die Artenvielfalt im Süßwasser nimmt doppelt so rasch ab wie jene in den Meeren oder Wäldern. Bereits 80 Arten von Süßwasserfischen wurden für «ausgestorben» erklärt, 16 davon allein im Jahr 2020. Die Bestände wandernder Süßwasserfische sind seit 1970 um 76 Prozent zurückgegangen.

Biodiversitätsverlust in den aquatischen Ökosystemen

Abbildung 28

Übersicht über die Lebensräume und ihre Gefährdung

Gefährdungsbilanz (in %) der insgesamt 167 beurteilten Lebensraumtypen. Am stärksten gefährdet sind die aquatischen Lebensräume und die Moorlebensräume mit einem bis zu 100% bedrohten Zustand (Klasse «verletzlich» und höher) sowie die Agrarlebensräume. Im Total

ist knapp die Hälfte der Lebensräume bedroht, weitere rund 15 % sind potenziell gefährdet. Es verbleibt circa ein Drittel derzeit nicht gefährdeter Lebensräume.

Quelle: BAFU

- In der CH sind Gewässer jene Lebensräume, die mit Abstand am stärksten gefährdet oder vom Verschwinden bedroht sind.

Biodiversitätsverlust in den aquatischen Ökosystemen

Abbildung 31

Biologischer Zustand der Fliessgewässer

Ergebnisse der biologischen Untersuchungen im Rahmen der Nationalen Beobachtung Gewässerqualität (NAWA), eingeteilt nach den fünf Bewertungsklassen der Methodik des Modul-Stufen-Konzeptes. Die Organismengruppen reagieren unterschiedlich auf Wasserqualität,

Gewässerverbauungen und künstliche Abflussschwankungen. Dies führt zu unterschiedlich grossen Anteilen der Bewertungsklassen: Fische haben höhere Ansprüche an die Lebensraumqualität als z.B. Kieselalgen.

Quelle: BAFU – NAWA

- Innerhalb der aquatischen Organismen ist der biologische Zustand bei den Fischen am schlechtesten.

Ursachen des Biodiversitätsverlusts in Fliessgewässern

WWF Schweiz

Bergbach (schematisch)

Mittellandbach (schematisch)

9. März 2021:

09.03.2021 12:10:47 SDA 0093bsd

Schweiz / KBE / Bern (sda)

Politik, Parlament, 11009003, Oberhaus, Wirtschaft und Finanzen, Landwirtschaft/Agrar

Gewässerräume in Landwirtschaft sollen verkleinert werden können

Gewässerräume in Landwirtschaftszonen sollen verkleinert werden können, wenn sie die Futtergrundlage eines landwirtschaftlichen Betriebs gefährden. Der Ständerat hat am Dienstag eine entsprechende Motion angenommen.

Die oft recht gross festgelegten Gewässerräume in der Landwirtschaft würden gerade in Kantonen mit engen Verhältnissen im Talboden oft einen Grossteil der Futtergrundlage für die Betriebe entziehen, lautet die Begründung der Motion von alt-Ständerat Werner Hösli (SVP/GL). Auch Kantone mit einer Vielzahl an Nutzungskonflikten seien stark betroffen.

Umweltziele Landwirtschaft

2.3

Gewässerraum

2.3.1

Ziel

2008

Allgemeines Umweltziel

Ausreichender Gewässerraum im Sinne des Leitbildes Fliessgewässer mit gewässergerechtem Uferbereich gemäss Modulstufenkonzept.

Umweltziel Landwirtschaft

Ausreichender Gewässerraum im Sinne des Leitbildes Fliessgewässer mit gewässergerechtem Uferbereich gemäss Modulstufenkonzept im Landwirtschaftsgebiet.

Revision GSchG 2011

Die Pflicht der Kantone zur Festlegung des Gewässerraums und dessen extensive Gestaltung und Bewirtschaftung ist seit Januar 2011 im Gewässerschutzgesetz (GSchG) verankert und wurde im Juni des gleichen Jahres auf Verordnungsstufe (GSchV) konkretisiert. Der Gewässerraum stellt ein Kernelement der parlamentarischen Initiative «Schutz und Nutzung der Gewässer» (07.492) der UREK-S vom August 2008 dar, welche als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Lebendiges Wasser» (07.060) des Schweizerischen Fischerei-Verbandes erarbeitet wurde.

Revision GSchG 2011

4.1 GEWÄSSERSCHUTZGESETZ

Art. 36a Gewässerraum

¹ Die Kantone legen nach Anhörung der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer fest, der erforderlich ist für die Gewährleistung folgender Funktionen (Gewässerraum):

- a. die natürlichen Funktionen der Gewässer;
- b. den Schutz vor Hochwasser;
- c. die Gewässernutzung.

Art. 62b⁵⁹ Revitalisierung von Gewässern

⁵ Den Bewirtschaftern des Gewässerraums werden die Abgeltungen gemäss Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998⁶⁰ für die extensive Nutzung ihrer Flächen entrichtet. Das Landwirtschaftsbudget sowie der entsprechende Zahlungsrahmen werden zu diesem Zweck aufgestockt.

Umweltziele Landwirtschaft

2.3

Gewässerraum

2.3.1

Ziel

Allgemeines Umweltziel

2016

Das Umweltziel ist nicht erreicht.

Insgesamt ist zu erwarten, dass der flächenmässige Aspekt des Ziels in den nächsten 5 bis 10 Jahren erreicht wird. Der qualitative Aspekt – Ausgestaltung des Gewässerraumes gemäss dem Modul-Stufen-Konzept – wird im Landwirtschaftsgebiet in diesem Zeitraum voraussichtlich (noch) nicht erreicht.

Fazit

LDK | CDCA

Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren
Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture
Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Umwelt BAFU

Bundesamt für Raumentwicklung

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

GEWÄSSERRAUM

MODULARE ARBEITSHILFE ZUR FESTLEGUNG UND NUTZUNG DES GEWÄSSERRAUMS IN DER SCHWEIZ

Seit 2019
Arbeitshilfe zur einheitlichen
Umsetzung in der Schweiz

These 1:

Neben einem klimaadaptierten Wassermanagement braucht es für die Erhaltung und Förderung der ökologischen Gewässerfunktionen eine Anpassung der Landwirtschaft bei der Gestaltung von naturnahen Gewässerräumen.

These 2:

Die Gewässerräume in der Landwirtschaftszone sind von so grosser Klimarelevanz, dass sie im Vergleich zu anderen Biodiversitätsförderflächen eine bevorzugte Förderung verdienen.

These 1:

Neben einem klimaadaptierten Wassermanagement braucht es für die Erhaltung und Förderung der ökologischen Gewässerfunktionen eine Anpassung der Landwirtschaft bei der Gestaltung von naturnahen Gewässerräumen.

- Welches sind die klimarelevanten Ökosystemleistungen von Gewässerräumen?
- Wie kann die Landwirtschaft diese unterstützen?

These 2:

Die Gewässerräume in der Landwirtschaftszone sind von so grosser Klimarelevanz, dass sie im Vergleich zu anderen Biodiversitätsförderflächen eine bevorzugte Förderung verdienen.

Landwirtschaftliche Bewirtschaftung des Gewässerraums

Übersicht über die anrechenbaren und beitragsberechtigten Biodiversitätsförderflächen

Biodiversitätsförderfläche BFF	Kultur-Code BLW (Typ)	Anrechenbarkeit	Beitrag Qualitätsstufe		Verzweigungsbeitrag	NHG	
			I	II			
Wiesen und Weiden							
Extensiv genutzte Wiese	611 (1)	✓	✓	✓	✓	Beitrag möglich, abhängig vom Kanton	
Wenig intensiv genutzte Wiese	612 (4)	✓	✓	✓	✓		
Streueffläche	851 (5)	✓	✓	✓	✓		
Extensiv genutzte Weide	617 (2)	✓	✓	✓	✓		
Waldweide	618 (3)	✓	✓	✓	✓		
Uferwiese entlang von Fließgewässern	634	✓	✓	✓	✓		
Artenreiche Grün- und Streueffläche im Sommerungsgebiet	931			✓			
Acker							
Ackerschönstreifen	555 (6)	✓	✓		✓		
Buntbrache	556 (7A)	✓	✓ (1)		✓		
Rotationsbrache	557 (7B)	✓	✓ (1)		✓		
Saum auf Ackerfläche	559	✓	✓ (2)		✓		
Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge	572	✓	✓ (1)		✓		
Dauerkulturen und Gehölz							
Hochstamm-Feldobstbäume	921, 922, 923 (8)	✓	✓	✓	✓		
Standortgerechte Einzelbäume und Alleen	924 (9)	✓			✓		
Hecken, Feld- und Ufergehölze (einschliesslich Krautsaum)	852 (10)	✓	✓	✓	✓		
Reifläche mit natürlicher Artenvielfalt	717 (15)	✓		✓	✓		
Andere							
Wassergraben, Tümpel, Teich	904 (11)	✓					
Ruderalfläche, Steinhäufen, -wälle	905 (12)	✓					
Trockenmauer	906 (13)	✓					
Regionsspezifische BFF innerhalb der LN (auf offener Ackerfläche, Grünfläche und Weide, in Reben, Hecken, Feld- und Ufergehölzen)	594, 595, 693, 694, 735, 858 (16)	✓			✓		
Regionsspezifische BFF ausserhalb der LN	908 (16)	✓					

(1) Bunt- und Rotationsbrachen sowie Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge nur TZ - HZ
(2) Saum auf Ackerfläche nur TZ - BZ (I, II)

Der Gewässerraum kann landwirtschaftlich extensiv genutzt werden, sofern die Nutzung den Anforderungen der Direktzahlungsverordnung (DZV) an bestimmte Biodiversitätsförderflächen (BFF) entspricht. Extensive Dauergrünflächen sind ebenfalls zulässig.

Die beschlossene Extensivierung der Nutzung im Gewässerraum wird mit erhöhten Direktzahlungsbeiträgen entschädigt. Dazu wurde das Landwirtschaftsbudget um 20 Millionen Franken pro Jahr erhöht.

- Wie kann in der Landwirtschaft die Akzeptanz von und die Motivation für eine prioritäre Förderung von öko- und klimafunktionalen Gewässerräumen erhöht werden?

Vermeehrt Grundwasser nutzen als Lösung?

Input-Referat

Datum: 16. März 2021

Autor: Martin Würsten, Dipl. Ing. ETH

Hydrologische Kennzahlen, schematisch

Grundwasserspeicher Unteres Emmental

Zwingende flankierende Massnahmen

Fremdwasser ARA Emmenspitz

Bewässerungsbedarf
Sommerhalbjahr

In einem durchschnittlichen
Jahr heute ca. 7'000 m³/d

In einem durchschnittlichen
Jahr 2060 ca. 15'000 m³/d

In einem extrem trockenen
Jahr ca. 33'000 m³/d

Schmutzwasser

Fremdwasser

Abwassermengen - Trinkwasserverbrauch 2010 bis 2018

Grundwasserspeicher Unteres Emmental

Fruchtfolgen und Bewässerung

Nicht so

sondern so

Schweizer Gewässer im Klimawandel – 12. Symposium Anpassung an den Klimawandel Workshop 3 Region zentrales und östliches Mittelland

Strategische Aspekte

Anpassung: Auf Sicht oder pro-aktiv?

Ole Rößler, Bundesanstalt für Gewässerkunde
ehemals: Geographisches Institut, Universität Bern

KURZE WIEDERHOLUNG – VERÄNDERUNGEN DER ABFLUSSMENGEN – TEIL I

: die warteten den Jahren über dem 1981–2010 aschutz. urch- lie ganze

KURZE WIEDERHOLUNG – VERÄNDERUNGEN DER ABFLUSSMENGEN – TEIL II

Zu- und Abnahme saisonaler Abflussmengen

Wasserbilanz eines Niederschlagsarmen Jahres

Starke regionale Unterschiede – Beispiel Seeland für Übertragung weniger gut geeignet, da umfassende Infrastruktur und Gewässer vorhanden

KURZE WIEDERHOLUNG – VERÄNDERUNGEN DER GW-MENGEN

KURZE WIEDERHOLUNG – AUSWIRKUNGEN LANDWIRTSCHAFT – TEIL II

- Grundwasser als intraannuelle Speicher
- winterliche Abflüsse gleichen sommerlichen Verlust aus
- „Problem“: extreme Jahre

GW Speicher
kombinieren

Wenn bewässert
wird, muss es
effizienter erfolgen

Landwirtschaft
wird riesige
Probleme
bekommen

GW Speicher
schützen

Wassernutzungs-
konflikte
werden verschärft

Abflussmengen
nehmen im
Jahresverlauf
leicht ab

Keine
Wassernutzungs-
daten vorhanden,
ungenaueres Bild
vom Bedarf

Wassermengen-
nutzung ist durch
Wasserqualitäts-
daten zu ergänzen

rasche Maßnahmen
/
Reglementierungen

Integriertes
Flussgebiets-
management

Selbst-
verantwortung

THESE I: Effekt vorhanden, Adaptation möglich !

These I:

Der Effekt des Klimawandels und des hydrologischen Wandels auf die Landwirtschaft zwar spürbar, aber durch Anpassungen managebar.

Stimme zu, aber / denn

Managebar, aber mit Prioritäten

Technisch ökonomisch ja, ökologisch nicht

Stimme nicht zu, aber / denn

.....

THESE II: Adaptation ist ökonomisch-technisch rasch zu erreichen und am besten Individuell umzusetzen

These II:

Adaptation ist ökonomisch-technisch rasch zu erreichen und am besten Individuell umzusetzen, pro-aktive Steuerung ist zu ungenau und zu teuer.

Stimme zu, aber / denn

Man macht das, was sich lohnt

Ökonomische Vorgabe (Wasserpreis)

Stimme nicht zu, aber / denn

Einzugsgebietsmanagement, integriert ist benötigt

THESE I: Effekt vorhanden, Adaptation möglich !

These I:

Der Effekt des Klimawandels und des hydrologischen Wandels auf die Landwirtschaft zwar spürbar, aber durch Anpassungen managebar.

Stimme zu, aber / denn

Auswirkungen ja, regional und lokal deutliche Unterschiede (positiv)

Studien zeigen, dass Management möglich ist (NFP 61)

AgriAdapt

Große Effizienzsteigerungen bei der Wassernutzung möglich

Landwirtschaft durch Fruchtwechsel, Vertrieb, Einsatz effizientere Bewässerungsarten, sehr anpassungsfähig

Andere Faktoren wie Markt, Subventionen entscheidender

Stimme nicht zu, aber / denn

Auswirkungen ja, regional und lokal deutliche Unterschiede (negativ)

Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft noch nicht vollends simuliert
, ggfs. große Unterschätzung möglich

Nicht nur Wassernutzung, auch andere Folgen zu berücksichtigen (Hagel, Starkregen, HW), Marktlage, technischer Fortschritt

THESE II: Adaptation ist ökonomisch-technisch rasch zu erreichen und am besten Individuell umzusetzen

These II:

Adaptation ist ökonomisch-technisch rasch zu erreichen und am besten Individuell umzusetzen, pro-aktive Steuerung ist zu ungenau und zu teuer.

Stimme zu, aber / denn

Viele Auswirkungen und Risiken müssen lokal bewertet und Anpassungen geplant sein

„der Markt“ zeigt am besten, was noch profitable ist und welche Richtung eingeschlagen werden muss

Zu viele unbekannte Faktoren für eine pro-aktive Steuerung

Eine Förderungs-/Umlenkungssteuerung ist zu teuer und ungenau (Giesskannenprinzip)

Stimme nicht zu, aber / denn

Umbau der Wasserbereitstellung notwendig!

große Risiken für Betriebe

frühe, gesamtheitlich Anpassung mindert diese Risiken

Solidaritätsgedanke

Lösungsmöglichkeit Flussgebietsmanagement

Nur eine zentrale Förderungs-/Umlenkungssteuerung kann lokale Ungerechtigkeiten und Härten abfedern

Foto: Bewässerung beim Rückhaltebecken in Wohlen 2018 (Bild: Aargauer Zeitung/Christian Breitschmid)

Nachhaltige Bewässerung als Teil der Lösung

Thesen aus dem Pilotprojekt Landwirtschaft und Bewässerung im Klimawandel – Anpassung als Chance!“

Schlussveranstaltung Hydro-CH2018 vom 16. März 2021
und östliches Mittelland

Samuel Zahner, Eva Wieser, Ecoplan

Projektperimeter

Untersuchungsgebiet:

Bünztal und Reusstal im
Kanton Aargau

Bilanz (Verrechnung Bedarf und Dargebot) – Juli

Annahme: sämtliche **bewässerungsbedürftige** Kulturen werden bewässert

Annahme: nur **bewässerungswürdige** Kulturen werden bewässert

aufsummiert nach hydrologischem Teileinzugsgebiet [m^3 / Monat]:

-> angenommene Bewässerungseffizienz:
grundsätzlich 65 %, ausser bei Beeren und Obst 90 %

-> Für die Abschätzung des Dargebots sind Oberflächengewässer
und Niederschlag berücksichtigt

These 1: Bewässerung ist nur ein kleiner Teil der Lösung.

Anteil bewässerungswürdiger Kulturen an gesamter landwirtschaftlicher Nutzfläche der Region Bünztal

Hinweis: Die Einschätzung der Bewässerungswürdigkeit erfolgte aus heutiger Sicht, basierend auf Erfahrungen aus den letzten Trockenperioden. Als bewässerungswürdig gelten demnach alle Spezialkulturen und Kartoffeln. Bei diesen Kulturen wiegen unter aktuellen Produktionsbedingungen i.d.R. die dank Bewässerung erzielten Ertrags- oder Qualitätsgewinne die Bewässerungskosten auf. Die Daten zur Flächennutzung stammen aus der Betriebsstrukturdatenerhebung des Jahres 2019.

Ergänzende Lösungsansätze zur Bewässerung

3 Stossrichtungen

Wasserbezug für bewässerungswürdige Kulturen sicherstellen

Landwirtschaftliche Produktion und Agrarmarktsystem an zunehmende Trockenheit anpassen

Innovation und Digitalisierung vorantreiben

7 Handlungsfelder mit 27 Massnahmenvorschlägen

T1 – T2: Regionale Trinkwasserversorgung

E1 – E4: Ergänzungen zur Trinkwasserversorgung

A1 – A4: Agrarpolitik

B1 – B6: Betriebliches Risikomanagement

S1 – S2: Sensibilisierung

W1 – W4: Wissen zu toleranten Kulturen, Sorten und Anbausystemen

D1 – D5: Chancen der Digitalisierung

Wer?

Kanton, Gemeinden

Kanton, Gemeinden, Beratung

Bund, Kanton

Betriebe und Beratung

Branche

Forschung und Beratung

Kanton, Forschung, Beratung

These 2: Es braucht klare Kriterien, was eine nachhaltige Bewässerung bedeutet.

Z.B. einen klaren Rahmen, angelehnt an die SDG-Goals der Agenda 2030

Foto: Bewässerung beim Rückhaltebecken in Wohlen 2018 (Bild: Aargauer Zeitung/Christian Breitschmid)

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Ecoplan / Sofies-Emac (2020):
Landwirtschaft und Bewässerung im Klimawandel -
Anpassung als Chance. Im Auftrag des Kantons
Aargau, Abteilung Landschaft und Gewässer und
Landwirtschaft Aargau.

Weitere Infos und Berichte unter:

<https://www.ag.ch/de/klimanapassung.jsp>

<https://www.ecoplan.ch/de/projekte>

zahner@ecoplan.ch

+41 31 356 61 90

ECOPLAN

sofies
leading sustainability

KANTON AARGAU

Departemente
Bau, Verkehr und Umwelt / Abteilung
Landschaft und Gewässer
Finanzen und Ressourcen /
Landwirtschaft Aargau

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Pilotprogramm Anpassung an
den Klimawandel
Bundesamt für Umwelt BAFU
und Bundesamt für
Landwirtschaft BLW